


Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр
вирусологии и микробиологии»
(ФГБНУ ФИЦВиМ)



УТВЕРЖДАЮ»

Директор ФГБНУ ФИЦВиМ

Д.В.Колбасов

2018 г.

Отчет

«Исследование дезинфицирующей активности средства «ДЕЗОМИГ» в
отношении возбудителя гриппа птиц»

Вольгинский, 2018

РЕФЕРАТ

Отчет на 8 страницах, содержит 2 таблицы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: (ДЕЗОМИГ), вирус гриппа птиц, дезинфицирующее действие, лабораторные испытания.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ: представленный образец дезинфицирующего средства (ДЕЗОМИГ) производства компании ООО «МК-АгроТорг».

Средство представляет собой прозрачную жидкость. В качестве действующих веществ содержит формальдегид 7,5 % вес/объем, глутаровый альдегид 15 % вес/объем, четвертичные аммониевые соединения (бензалкония хлорид) 10 % вес/объем. Срок годности 3 года.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение дезинфицирующего действия средства (ДЕЗОМИГ) в отношении вирулентного вируса гриппа птиц на контаминированных поверхностях, имитирующих объекты птицеводческих помещений.

В лабораторных условиях испытана эффективность дезинфицирующего действия средства при обеззараживании контаминированных вирусом гриппа птиц поверхностей, имитирующих объекты животноводческих помещений с подтверждением полноты инактивации вируса на куриных эмбрионах.

ВВЕДЕНИЕ

В системе санитарных, противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих благополучие страны по инфекционным болезням, повышение продуктивности животных и санитарное качество продуктов, сырья и кормов животного происхождения, дезинфекция занимает одно из важных мест. Под дезинфекцией понимают уничтожение на объектах или удаление из них патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Основное назначение дезинфекции – разорвать эпизоотическую цепь путем воздействия на ее важное звено – фактор передачи возбудителя болезни от источника инфекции к восприимчивому организму.

В последние годы на рынке дезинфицирующих средств представлен большой ассортимент препаратов отечественного и импортного производства. Но при всем многообразии дезинфицирующих средств, количество компонентов, входящих в их состав, весьма ограничено, при чем целый ряд соединений обладает высокой бактерио- и вирусстатической активностью и низким бактерицидным и вирулицидным действием, что не позволяет им эффективно обеззараживать контаминированные поверхности, особенно загрязненные органическими веществами. Проблема внедрения новых высокоэффективных дезинфектантов приобрела особую актуальность в связи с распространением по территории РФ высокопатогенного гриппа птиц, представляющего угрозу птицеводству страны.

Учитывая то, что для большого количества дезинфектантов не изучена их вирулицидная активность в отношении вируса гриппа птиц, целесообразно проведение работ по обеспечению ветеринарной дезинфекционной практики протестированными высокоэффективными дезсредствами.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Испытания выполнены в рамках договора № 29/18 от 10 августа 2018 г. согласно руководству Р 4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», «Методическим указаниям о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики», утвержденным ГУВ Госагропрома СССР в 1987 г. и методическим указаниям МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Инфекционная активность вируса гриппа птиц штамм А/курица/Сергиев-Посад/1/17 (H5N8) в куриных эмбрионах.

Дезинфицирующее действие средства (ДЕЗОМИГ) на вирус гриппа птиц с использованием тест-объектов (впитывающие – бетон) и выделение вируса гриппа птиц в куриных эмбрионах 9-11 суточного возраста.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Материалы:

- Вирус гриппа птиц штамм А/курица/Сергиев-Посад/1/17 (H5N8), инфекционная активность 9,75 Ig ЭИД₅₀/см³.
- Средство (ДЕЗОМИГ). Серия DZ1804E, дата изготовления 01.2018, годен до 12/2020.
- Куриные эмбрионы 9 – 11 суточного возраста.

2. Методы

Определение инфекционной активности вируса гриппа птиц (ВГП) в куриных эмбрионах (КЭ)

Для определения инфекционной активности ВГП готовили десятикратные последовательные разведения вируссодержащей экстрактомбиональной жидкости (ЭЭЖ) на физиологическом растворе с 10⁻¹ по 10⁻⁹. Затем каждым разведением проводили заражение КЭ. Зараженные КЭ инкубировали при температуре 37±0,5°C в течение 72 часов. Через 72 часа от всех КЭ отбирали ЭЭЖ и ставили реакцию гемагглютинации (РГА). Титр вируса рассчитывали по методу Кербера в модификации И.П. Ашмарина и выражали в Ig ЭИД₅₀/см³.

Оценка дезинфицирующего действия средства (ДЕЗОМИГ)

При исследованиях с вирусом, использовали вирулентный эпизоотически значимый ВГП. На стерильные тест-объекты имитирующие объекты птицеводческих помещений (шероховатые впитывающие поверхности из бетона) наносили по 1,5 см³ вируссодержащей жидкости на 100 см² площади. В качестве механической защиты вируса использовали не содержащую вирус ЭЭЖ. Смесь равномерно распределяли по поверхности тестов, после чего их подсушивают 1 час. Испытуемые растворы дезинфицирующего средства (согласно таблице 1) равномерно наносили методом орошения на тест-объекты из расчёта 0,3 л/м² площади.

На контрольные тест-объекты вместо раствора средства наносят такое же количество воды, которую использовали для приготовления раствора препарата.

С тест-объектов, обработанных испытуемыми растворами препаратов, материал для исследования отбирают через соответствующий период времени (согласно таблице 1).

Вирусный материал соскабливали, добавляли по 4,5 см³ физиологического раствора, экстрагируют при комнатной температуре в течение 30 минут, затем центрифугируют 15 мин. при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость используют для заражения куриных эмбрионов.

Надосадочную жидкость с одного тест-объекта вводили 6 куриным эмбрионам и 6 КЭ использовали в качестве контроля. Зараженные КЭ инкубировали при 37°C в течение 72-96 часов. Овоскопию зараженных КЭ проводили ежедневно. КЭ, павшие в течение 24 часов после заражения отбраковывали (неспецифическая гибель). Павшие КЭ в последующие сроки инкубации помещали в холодильник. По окончании инкубации оставшиеся живыми КЭ также помещали в холодильник не менее чем на 12 часов.

С ЭЭЖ охлаждённых КЭ ставили РГА для выявления вируса. С этой целью с каждого КЭ берут каплю ЭЭЖ и помещали на предметное стекло, затем к этой ЭЭЖ добавляют по капле 1-2%-ных куриных эритроцитов и компоненты смешивают покачиванием стекла. Смесь ЭЭЖ и эритроцитов оставляют на контакт при комнатной температуре в течение 10-15 минут и учитывают результаты реакции.

Дезинфекцию признавали эффективной, если при заражении КЭ материалом с исследуемых тест-объектов не отмечали гибели КЭ и результат исследования ЭЭЖ в реакции гемагглютинации был отрицательным.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследование эффективности средства (ДЕЗОМИГ) в отношении вируса гриппа птиц (ВГП) проводили в соответствии с техническим заданием по схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1
Схема проведения оценки эффективности препарата (ДЕЗОМИГ).

| Впитывающие (бетон) | |
|---------------------|------------------|
| Время (мин) | Концентрация (%) |
| 10 | 0,25 |
| 30 | 0,25 |

Результаты испытаний дезинфицирующего действия средства (ДЕЗОМИГ) в отношении вируса гриппа птиц с использованием куриных эмбрионов и реакции гемагглютинации представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результат оценки дезинфицирующего действия препарата (ДЕЗОМИГ) в отношении ВГП; n=3

| Повторность | Группа | Экспозиция, мин | |
|-------------|----------|-----------------|-----|
| | | 10 | 30 |
| 1 | Препарат | 3/6 | 0/6 |
| | Контроль | 6/6 | 6/6 |
| 2 | Препарат | 4/6 | 0/6 |
| | Контроль | 6/6 | 6/6 |
| 3 | Препарат | 4/6 | 0/6 |
| | Контроль | 6/6 | 6/6 |

Результаты, представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что препарат (ДЕЗОМИГ) при обработке впитывающей шероховатой поверхности с белковой нагрузкой препарат эффективен в отношении ВГП в виде 0,25% рабочего раствора при экспозиции 30 минут. При обработке тест-объектов в данном режиме падеж КЭ не отмечен, результат РГА отрицательный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Дезинфицирующее средство (ДЕЗОМИГ) полностью обеззараживает тест-поверхности имитирующие объекты птицеводческих помещений (впитывающие шероховатые поверхности из бетона), контаминированные вирулентным вирусом гриппа птиц с белковой нагрузкой при однократном орошении 0,25% и выше рабочим раствором при экспозиции 30 минут и более при норме расхода 0,3 л/м².

Руководитель испытаний:

Заведующий НЭО

кандидат ветеринарных наук




С.П. Живодеров

Исполнители:

Микробиолог

Микробиолог



Е.Н. Глухарева

Н.К. Бобровская